

鼻炎用内服薬

つらい鼻炎症状の緩和に ジキナ®BD鼻炎カプセル 〈カプセル剤〉

かぜによる急性鼻炎や花粉・ハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎に。
鼻みず・鼻づまり・くしゃみなどの症状を緩和して、効き目をあらわす鼻炎用内服薬です。
◆ブソイドエフェドリン塩酸塩が鼻づまりを緩和します。
◆ペラドンナ総アルカロイドとd-クロロフェニラミンマレイン酸塩が鼻みずを緩和します。
◆アレルギー症状を抑える生薬成分(サイシン乾燥エキス)を配合。
◆1回1カプセルの服用で、不快な鼻炎症状にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)次の症状のある人
前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)授乳中の人
- (4)高齢者
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人
緑内障、腎臓病
- (9)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人
(セレギリン塩酸塩はパーキンソン病の治療に用いられます。)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

裏面もお読みください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後に水またはぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15才以上)	1カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〈カプセルの取り出し方〉



成分・分量

1日量(3カプセル)中

成 分	分 量	は た ら き
プソイドエフェドリン塩酸塩	105mg	末梢血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを緩和します。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4.5mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻みずをおさえます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	粘液の分泌を抑制して、鼻みず・なみだ目をおさえます。
無水カフェイン	120mg	鼻炎にともなう頭重をやわらげます。
サイシン乾燥エキス (原生葉換算量)	30mg (300mg)	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻みずをおさえます。

添加物：バレिशョデンプン、乳糖水和物、セルロース、ステアリン酸Mg、青色1号、赤色3号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、ゼラチン 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 048-648-1118 9：00～17：30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地