

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

皮ふ炎、かぶれに

第②類医薬品

フジアローEX軟膏

皮膚疾患治療薬

フジアローEX軟膏は、アンテドラッグステロイドであるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)を含む8つの有効成分を配合し、湿疹、皮膚炎、かゆみなどの症状に優れた効果を発揮します。本品は、軟膏タイプで皮膚にしっかり密着し、乾燥を防ぎます。

アンテドラッグステロイドとは

皮膚表面の患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される性質を持つ成分です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2)目の周囲、粘膜等

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。

3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

効能・効果

皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

用法・用量



1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出して
ください。(①→②)

●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。



折り曲げないでください。 折りたたまないでください。

成分・分量

100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15g	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
クロタミトン	5.0g	患部のかゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	1.0g	血行を促進し、治療を助けます。
グリチルレチン酸	0.5g	患部の炎症を抑えます。
アラントイン	0.2g	傷の治りを助け、組織を修復します。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により痛み、かゆみを抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

添加物として、マクロゴール、クエン酸水和物を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 (048) 648-1118
9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地