

押して開けてください

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

【X】 してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ります) など)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本品の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしきことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、眼瞼、陰部等、陰のう、外陰部等)(2)湿疹(3)湿潤、ただれ、電気や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)乳幼児(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)患部が顔面又は広範囲の人(6)患部が化膿している人(7)「湿疹」か「みずむし」か「いんさんむし」ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑(フケ、アカのよきぬ皮膚のはがれ)、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

みずむし、いんさんむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関する注意＞

(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと(3)目に入らないように注意すること。万一、目にに入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること(4)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないこと(5)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること(6)外用にのみ使用すること

成分・分量

(100g中)
ブテナフィン塩酸塩 1.0g、リドカイン 2.0g、グリチルレチン酸 0.5g、クロタミントン 5.0g、dl-カンフル 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.3g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g、l-メントール 2.0g
添加剤：ミリスチン酸イソプロピル、ブロビレンピクリコール、ボリルペート60、カルボキシビニルポリマー、パラベン、トリエタノールアミン 含有

第②類医薬品

販売名：マイルゾンBTクリーム
水虫・たむし用
内容量 30g

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品（学術室）
電話（048）648-1118
9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

水虫 たむしに マイルゾンBT クリーム

殺真菌成分 (ブテナフィン塩酸塩) + かゆみ止め成分

8種の 有効成分配合

1日1回

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えなさいこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)
- チューブの口に穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合があるので注意すること
- チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出すこと(6)折り曲げたり折りたたむと、チューブが壊れて薬剤がとび出るおそれがある
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること

<水虫治療のポイント>

- 患部を清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。○水虫菌(白癬菌)は、症状のある範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布しましょう。○かゆみ等がなくなても、完治していない場合があるため、根気よく治療を継続しましょう。○患部がむれないように十分に乾燥させましょう。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



4 987524 104819

セルフメティケーション
税控除対象
紙 02AH00