

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ここを押して  
開けてください。

# サンツール<sup>®</sup>LXテープαL (外用鎮痛消炎薬) 第2類医薬品

7枚入

## △使用上の注意

### ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15才未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください)

### 🗨️相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 妊娠又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者 (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状                                     |
|------|--|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着 |
| 消化器  | 胃部不快感、みぞおちの痛み                          |
| その他  | むくみ                                    |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

| 症状の名称           | 症状  |
|-----------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢・軟便
4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性あります)

製造販売元：東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸瀬1229番地

発売元：株式会社富士薬品  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)  
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



商品詳細へ



4 987524 123919

10cm

14cm

使用開始日  
年 月 日

## 効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、離断炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

## 用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 1日あたり2枚を超えて使用しないでください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 <膏体100g中> 1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量1.4g

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 8.10g<br>(無水物として7.14g) |
| l-メントール          | 3.5g                   |
| トコフェロール酢酸エステル    | 2.3g                   |
| グリチルレチン酸         | 0.19g                  |

添加物: ミリスチン酸イソプロピル、ジブチルヒドロキシトルエン、タルク、ステレン-イソブレン-スチレンブロックコポリマー、テルペン樹脂、香料、流動パラフィン、その他1成分 含有

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

つらい痛み  
に直接浸透  
サンツール<sup>®</sup>  
LXテープαL

肩の痛み・腰痛・関節痛・腱鞘炎

外用鎮痛  
消炎薬  
テープ  
7枚  
第2類医薬品

つらい痛みに直接浸透  
サンツール<sup>®</sup>  
LXテープαL

肩の痛み・腰痛  
関節痛・腱鞘炎

外用鎮痛  
消炎薬 テープ 7枚

第2類医薬品

つらい痛みに直接浸透  
サンツール<sup>®</sup>  
LXテープαL

肩の痛み  
腰痛  
関節痛  
腱鞘炎

外用鎮痛  
消炎薬  
テープ  
7枚  
第2類医薬品

肩の痛み・腰痛・関節痛・腱鞘炎


つらい痛みに直接浸透  
サンツール<sup>®</sup>  
LXテープαL

1日1回  
24時間  
効果が持続

ロキソプロフェン  
+ ナトリウム水和物 配合  
l-メントール

広い範囲に便利な  
Lサイズ

全方向伸縮  
タイプ



【テープ】7枚入  
1枚サイズ 10cm×14cm

富士薬品

セルフメディケーション  
税 控除 対象 外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

つらい痛みに直接浸透  
サンツール<sup>®</sup>  
LXテープαL

外用鎮痛  
消炎薬 テープ 7枚

第2類医薬品

製造番号  
使用期限