

この説明文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

第2類医薬品

## 腰・関節・筋肉・肩こりの痛みに インドメタシン局所吸収薬 **インテゲル1%**

- ◆消炎鎮痛成分インドメタシンが、痛みの原因物質（プロスタグランジンなど）の生成を抑え、腰・関節・筋肉・肩こりの痛みなどにすぐれた効果を発揮します。
- ◆ $\ell$ -メントールを配合していますので、さわやかな清涼感があります。
- ◆べとつきにくく、塗りやすい、伸びのあるゲル製剤です。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2)ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等  
(2)湿疹、かぶれ、傷口  
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

- ・筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛
- ・関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)
- ・打撲、捻挫

### 用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)11才未満の小児に使用させないでください。
- (3)11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (7)薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (8)使用後は、手を洗ってください。

### 成分・分量

(100g中)

成 分	含 量
インドメタシン	1,000mg
$\ell$ -メントール	3,000mg

添加剤：ジイソプロパノールアミン、エデト酸Na水和物、エタノール、ベンジルアルコール、カルボキシビニルポリマー、チオ硫酸Na水和物、ヒプロメロース、キサンタンガム、1,3-ブチレングリコール、ハアセチルしょ糖、N-メチル-2-ピロリドン含有

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
- (4)本剤が衣服や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水が洗剤で洗い落としてください。
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (8)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品内容のご相談窓口 株式会社 富士薬品 (学術室)  
電 話 (048)648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

発売元 **株式会社 富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

製造販売元 **東光薬品工業株式会社**  
東京都足立区新田2丁目16番23号