

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

フェルピナク製剤
鎮痛消炎パップ剤

イスターパップ®FB

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 次の人は使用しないで下さい。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15歳未満の小児
 - 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口
 - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - 連続して2週間以上使用しないで下さい。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量 15歳以上:表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。15歳未満:使用しないで下さい。
(用法・用量に関連する注意)(1)定められた用法・用量を守って下さい。(2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。(4)患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

成分・分量 (膏体100g中)

成 分	含 量	はたらき
フェルピナク	0.7g	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物:ゼラチン、エトナトリウム水和物、マクロゴール、ポリソルベート80、メントール、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースナトリウム、pH調整剤、その他2成分含有

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(製用の原因になったり、品質が変わることがある) (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

8枚入 [1枚:12cm×8.5cm]

配置期限

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



製造番号

お客様ご相談窓口
(株)富士薬品(学術室)
☎(048)648-1118
受付 9:00～17:30
(土・日・祝日を除く)



(01)14987524904737(93)2507

発売元

製造販売元

株式会社富士薬品 東和製薬株式会社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地 和歌山県紀の川市貴志川町丸尾1229番地 01