

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα

肩の痛み・腰痛
筋肉痛・関節痛

外用鎮痛
消炎薬 テープ 21枚

第2類医薬品

01

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα


肩の痛み
腰痛
筋肉痛
関節痛

外用鎮痛
消炎薬 テープ 21枚

第2類医薬品

肩の痛み・腰痛
筋肉痛・関節痛

鎮痛力 ジクロフェナク
+ ナトリウム配合
+ l-メントール



【テープ】21枚入(7枚入×3袋)
1枚サイズ 7cm×10cm

富士薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

痛みを鎮める
サンツール®
DFテープα

肩の痛み・腰痛
筋肉痛・関節痛

外用鎮痛
消炎薬 テープ 21枚

第2類医薬品

ここを押して
開けてください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

サンツール®DFテープα (外用鎮痛消炎薬) 第2類医薬品 21枚入
1枚:7cm×10cm

△ 使用上の注意

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(デニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量をお守りください。(2)1回あたり、24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

成分・分量 <膏体100g中>

ジクロフェナクナトリウム	2.0g
l-メントール	3.5g
添加物:イソステアリン酸、BHT、ステレン・インブレン・ステレンブロックコポリマー、テルペン樹脂、スクワラン、流動パラフィン 含有	

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のフラスナーを開けて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

発売元：株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
☎048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

紙



商品
詳細へ

使用期限

製造番号