

4 9874501003026

【使用上の注意】
(相服すること) 1.服用後、次の症状があらわれれば、場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この薬品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。○皮膚：発疹・発赤、かゆみ 2.しめうち服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この薬品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがある)。(4)使用期限を過ぎた薬品は服用しないこと。【用法・用量】成人(15才以上) 1回1本(100mL)を1日1回服用してください。●定められた用法・用量を厳守してください。●15才未満は服用しないください。●本剤は生薬成分を含むため、まれに過敏を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく量ってから服用してください。

お問い合わせ先 東和製薬株式会社 お客様相談室
☎0120-108871 9:00～17:30(土、日、祝日も可)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931
相談無料です。

東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市真珠川町4番地1229番地

がんばるあなたの 強い味方

**リッチミン[®]
スーパーEX**

人参・淫羊藿・タウリン3000mg配合

**SUPER
EX**

第2類医薬品 100mL

リッチミンスーパーEX

【効能・効果】
○滋養強壮
○虚弱体質
○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・
栄養障害・発熱性消耗性疾患・
産前産後などの場合の栄養補給

使用
期限

Lot.

【成分・分量】1日量1本(100mL)中
チアミン塩化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビン
(ビタミンB₂)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン
B₆)10mg、ニコチン酸アミド50mg、無水カフェイン
50mg、イノシトール100mg、タウリン3,000mg、
L-アスパラギン酸ナトリウム150mg、L-アルギ
ニン塩酸塩300mg、イカリソウエキス100mg
(原生乾燥質量:500mg)、ニンジンエキス90mg
(原生乾燥質量:603mg)
添加剤:白糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、キサン
タンガム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン
グリコール、交鎖多糖Na、パラベン、エタノール、香料、
グリセリン 含有(アルコール0.2mL以下)
●本剤に配合されているリボフラビンにより、
尿が黄色くなる場合があります。
ガラス:瓶 金属:キャップ OJH