

アンダーライン部分は2023年11月に追記しました。

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤

新セიმビタン®ゴールド〈カプセル〉

◆新セიმビタン®ゴールドは、吸収のよいビタミンB₁誘導体ベンフォチアミンを主成分として、ビタミンB₂・B₆・B₁₂・E、ニコチン酸アミドを配合したビタミン剤です。日常の肩こり・手足のしびれ・目を酷使する人の眼精疲労の緩和に効果があります。
このほか、ガンマーオリザノールや加工ダイサン末も効果を補います。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 ・ 効 果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用 法 ・ 用 量

次の1回量を1日1回、水またはぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上（成人）	1カプセル	1回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉 定められた用法・用量をお守りください。

成 分 ・ 分 量

1日量（1カプセル）中

成 分	分 量	は た ら き
ベンフォチアミン（ビタミンB ₁ 誘導体）	100mg	糖質の代謝に関与し、疲労回復を助けます。また、神経機能の維持に関与します。
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	3mg	脂質代謝を促進し、エネルギーの産生に関与します。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	25mg	神経伝達物質の合成を促進し、目の疲れ、肩こりをやわらげます。
シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）	60μg	末梢神経のダメージを修復し、神経痛やしびれをやわらげます。
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム（ビタミンE）	50mg	血行を改善し、肩こりや手足のしびれを緩和します。
ニコチン酸アミド	30mg	血行を改善し、肩こりなどを緩和します。
ガンマーオリザノール	5mg	自律神経に働きかけ、腰痛や関節痛などをやわらげます。
加工ダイサン末	20mg	ニンニクの成分で、ビタミンB ₁ 、B ₆ の吸収を促進します。また血流をよくします。

添加物：トウモロコシデンプン、リン酸水素Ca、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロース、カラギーナン、黄色5号、ソルビタン脂肪酸エステル 含有

〈成分・分量に関連する注意〉 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンによるものなので心配はいりません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬㈱ お客様相談室

電話 0120-108871 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元

東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

05CG00